



**Escola Superior de  
Enfermagem de Coimbra**

Tabela de terapêutica

Ensino Clínico em Situações de Défice no Autocuidado

Nome do utente: G.J (género masculino, 86 anos)

Fármaco	Grupo <b>Farmacoterapêutico</b>	Forma <b>Farmacologica</b>	Posologia	Via de Administração	Periodicidade	Indicações Terapêuticas	Efeitos Adversos

Losartan	Anti-Hipertensores	Comprimido	50mg	Oral	1id (9h)	O losartan utiliza-se para tratar a hipertensão arterial, porém, o seu interesse não se esgota no tratamento da hipertensão arterial, pois têm sido utilizados com sucesso, na sua maioria, no tratamento da insuficiência cardíaca ou em doentes (clinicamente estáveis), com disfunção ventricular pós enfarte.	Cefaleias, Tonturas, Astenia, Dores musculares.
----------	--------------------	------------	------	------	----------	---	---

Lasix	Anti-Hipertensores	Comprimido	40mg	Oral	0.5id (9)	O Lasix está indicado na remoção dos edemas e congestão pulmonar causados por doenças hepáticas ou renais. Está também indicado em outros tipos de edema mais leves e refratários ao tratamento com tiazidas. É usado em situações de oligúria (em caso de IR aguda ou crônica), no tratamento urgente de hipercalcemia (uma vez que promove excreção urinária de cálcio) e na HTA.	Hipocaliemia, Cefaleias, Hipotensão, Sede, Fadiga.
-------	--------------------	------------	------	------	-----------	---	--

Memantina	Medicamentos utilizados no tratamento sintomático das alterações das funções cognitivas	Comprimido	20mg	Oral	1id (9h)	A Memantina é utilizada no tratamento sintomático da doença de Alzheimer moderada a grave.	
Rivastigmina	Medicamentos utilizados no tratamento sintomático das alterações das funções cognitivas	Cápsula	4.6mg	Oral	1id (9h)	A Rivastigmina é utilizada no tratamento sintomático da demência associada à doença de Alzheimer ou de Parkinson ligeira a moderada	Náuseas, Vômitos, Perda de peso, Tonturas
Atorvastatina	Estaninas	Comprimido	20mg	Oral	1id (19h)	A Atorvastatina é dotada de grande interesse no tratamento da hipercolesterolemia e da dislipidemia mista.	Dores abdominais, Náuseas, obstipação.

Serenal	Benzodiazepinas	Comprimido	15mg	Oral	1id (19h)	O Serenal é dotado de grande interesse no tratamento de ansiedade e sintomas ansiosos	Sonolência e incoordenação motora, Alteração da memória a curto prazo, Confusão,
Risperidona	Antipsicóticos	Comprimido	0.5mg	Oral	1id (19h)	A Risperidona é dotada de grande interesse no tratamento de esquizofrenia e outras psicoses	Movimentos distónicos, Crises oculogirias, Síndromes parkinsónicas.

Quetiapina	Antipsicóticos	Comprimido	50mg	Oral	1id (22h)	A Quetiapina é dotada de grande interesse no tratamento de ansiedade e sintomas ansiosos	Hipotensão ortostática, Taquicardia.
------------	----------------	------------	------	------	-----------	--	--------------------------------------

**EM CASO DE SOS:**

Risperidona	Antipsicóticos	Comprimido	0.5mg	Oral	1id (19h)	A Risperidona é dotada de grande interesse no tratamento de esquizofrenia e outras psicoses	Movimentos distónicos, Crises oculogirias, Síndromes parkinsónicos.
-------------	----------------	------------	-------	------	-----------	---	---